

# A FACE MULTIDISCIPLINAR DAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS 2

JÚLIO CÉSAR RIBEIRO  
CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS  
(ORGANIZADORES)



Júlio César Ribeiro  
Carlos Antônio dos Santos  
(Organizadores)

# A Face Multidisciplinar das Ciências Agrárias

## 2

Atena Editora  
2019

2019 by Atena Editora  
Copyright © Atena Editora  
Copyright do Texto © 2019 Os Autores  
Copyright da Edição © 2019 Atena Editora  
Editora Executiva: Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Antonella Carvalho de Oliveira  
Diagramação: Natália Sandrini  
Edição de Arte: Lorena Prestes  
Revisão: Os Autores

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos autores. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais.

### **Conselho Editorial**

#### **Ciências Humanas e Sociais Aplicadas**

Prof. Dr. Álvaro Augusto de Borba Barreto – Universidade Federal de Pelotas  
Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná  
Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília  
Prof. Dr. Constantino Ribeiro de Oliveira Junior – Universidade Estadual de Ponta Grossa  
Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Cristina Gaio – Universidade de Lisboa  
Prof. Dr. Deyvison de Lima Oliveira – Universidade Federal de Rondônia  
Prof. Dr. Gilmei Fleck – Universidade Estadual do Oeste do Paraná  
Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionele delle Figlie de Maria Ausiliatrice  
Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense  
Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins  
Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte  
Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa  
Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará  
Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande  
Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins

#### **Ciências Agrárias e Multidisciplinar**

Prof. Dr. Alan Mario Zuffo – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  
Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano  
Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Daiane Garabeli Trojan – Universidade Norte do Paraná  
Prof. Dr. Darllan Collins da Cunha e Silva – Universidade Estadual Paulista  
Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul  
Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia  
Prof. Dr. Jorge González Aguilera – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  
Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará  
Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas

#### **Ciências Biológicas e da Saúde**

Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás  
Prof.<sup>a</sup> Dr.<sup>a</sup> Elane Schwinden Prudêncio – Universidade Federal de Santa Catarina  
Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria  
Prof. Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará

Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte  
Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão  
Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa  
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande

### **Ciências Exatas e da Terra e Engenharias**

Prof. Dr. Adélio Alcino Sampaio Castro Machado – Universidade do Porto  
Prof. Dr. Eloi Rufato Junior – Universidade Tecnológica Federal do Paraná  
Prof. Dr. Fabrício Menezes Ramos – Instituto Federal do Pará  
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte  
Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista

### **Conselho Técnico Científico**

Prof. Msc. Abrãao Carvalho Nogueira – Universidade Federal do Espírito Santo  
Prof. Dr. Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos – Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional Paraíba  
Prof. Msc. André Flávio Gonçalves Silva – Universidade Federal do Maranhão  
Prof.ª Drª Andreza Lopes – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Acadêmico  
Prof. Msc. Carlos Antônio dos Santos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro  
Prof. Msc. Daniel da Silva Miranda – Universidade Federal do Pará  
Prof. Msc. Eliel Constantino da Silva – Universidade Estadual Paulista  
Prof.ª Msc. Jaqueline Oliveira Rezende – Universidade Federal de Uberlândia  
Prof. Msc. Leonardo Tullio – Universidade Estadual de Ponta Grossa  
Prof.ª Msc. Renata Luciane Polsaque Young Blood – UniSecal  
Prof. Dr. Welleson Feitosa Gazel – Universidade Paulista

<b>Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG)</b>	
F138	A face multidisciplinar das ciências agrárias 2 [recurso eletrônico] / Organizadores Júlio César Ribeiro, Carlos Antônio dos Santos. – Ponta Grossa (PR): Atena Editora, 2019. – (A Face Multidisciplinar das Ciências Agrárias; v. 2)  Formato: PDF Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader. Modo de acesso: World Wide Web. Inclui bibliografia ISBN 978-85-7247-502-0 DOI 10.22533/at.ed.020192907  1. Agricultura. 2. Ciências ambientais. 3. Pesquisa agrária – Brasil. I. Ribeiro, Júlio César. II. Santos, Carlos Antônio dos. III. Série. CDD 630
<b>Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422</b>	

Atena Editora  
Ponta Grossa – Paraná - Brasil  
[www.atenaeditora.com.br](http://www.atenaeditora.com.br)  
contato@atenaeditora.com.br

## APRESENTAÇÃO

Com grande satisfação apresentamos o e-book "A Face Multidisciplinar das Ciências Agrárias", que foi idealizado para a divulgação de grandes resultados e avanços relacionados às diferentes vertentes das Ciências Agrárias. Esta iniciativa está estruturada em dois volumes, 1 e 2, que contam com 21 e 21 capítulos, respectivamente.

No volume 2, são inicialmente apresentados estudos referentes à produção de conhecimento na área de veterinária com temas alinhados à atividade pesqueira e pecuária. Nestes trabalhos, são levantados questionamentos importantes acerca de temas de ordem socioambiental, produtiva, epidemiológica, e controle biológico de parasitas. Em uma segunda parte, são abordadas questões relativas aos diferentes segmentos das cadeias produtivas, além de extensão e empreendedorismo no meio rural. Neste volume, também poderão ser apreciados estudos envolvendo tecnologia de alimentos e ferramentas voltadas à análise de dados.

Agradecemos a dedicação e empenho dos autores vinculados a diferentes instituições de ensino, pesquisa e extensão do Brasil e exterior, por compartilharem ao grande público os principais resultados desenvolvidos pelos seus respectivos grupos de trabalho.

Desejamos que os trabalhos apresentados neste projeto, em seus dois volumes, possam estimular o fortalecimento dos estudos relacionados às Ciências Agrárias, uma grande área de extrema importância para o desenvolvimento econômico e social do nosso país.

Júlio César Ribeiro  
Carlos Antônio dos Santos

## SUMÁRIO

<b>CAPÍTULO 1</b> .....	<b>1</b>
CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA EM DOIS LAGOS DE INUNDAÇÃO AMAZÔNICO, SANTARÉM, PARÁ	
Elizabeth de Matos Serrão Yohana Gabriely Sousa Rabelo Jerry Max Sanches Corrêa Diego Maia Zacardi	
<b>DOI 10.22533/at.ed.0201929071</b>	
<b>CAPÍTULO 2</b> .....	<b>13</b>
PROBLEMÁTICAS E CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS DA PESCA PRATICADA NO LAGO MAICÁ, SANTARÉM, PARÁ	
Diego Patrick Fróes Campos Yana Karine da Silva Coelho Elizabeth Matos Serrão Diego Maia Zacardi	
<b>DOI 10.22533/at.ed.0201929072</b>	
<b>CAPÍTULO 3</b> .....	<b>25</b>
ÁREA DE DESOVA E RECRUTAMENTO PARA PEIXES DE INTERESSE COMERCIAL NO BAIXO AMAZONAS: IMPLICAÇÕES PARA CONSERVAÇÃO	
Diego Maia Zacardi Silvana Cristina Silva da Ponte Lucas Silva de Oliveira Ruineris Almada Cajado Luan Robson Bentes dos Santos	
<b>DOI 10.22533/at.ed.0201929073</b>	
<b>CAPÍTULO 4</b> .....	<b>39</b>
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PECUÁRIA EM ASSENTAMENTOS DO SERTÃO CENTRAL DO CEARÁ, BRASIL	
Maria Vivianne Freitas Gomes de Miranda Tiago da Silva Teófilo Eugênia Emanuele dos Reis Lemos Clayanne Sousa Mariano Lúcia Mara dos Reis Lemos Francisco Mendes Coelho Florença Moreira Gonçalves Francisca Clarice Rodrigues de Sousa Antonia Rafaela da Luz dos Santos Igor Emmanuel Melo da Silva Edimilson dos Santos Nascimento Paulo Cleber Luncks de Almeida	
<b>DOI 10.22533/at.ed.0201929074</b>	

**CAPÍTULO 5 ..... 46**

INFLUÊNCIA DA ESTAÇÃO DO ANO, DO MOMENTO DA INSEMINAÇÃO E DA TEMPERATURA RETAL NA TAXA DE CONCEPÇÃO DE VACAS LEITEIRAS MISTIÇAS

Fransérgio Rocha de Souza  
Carla Cristian Campos  
Natascha Almeida Marques da Silva  
Ricarda Maria dos Santos

**DOI 10.22533/at.ed.0201929075**

**CAPÍTULO 6 ..... 55**

RISK FACTORS ASSOCIATED WITH THE EPIDEMIOLOGY OF *Toxoplasma gondii* IN CATTLE AND BUFFALOES IN THE STATE OF PARÁ, BRAZIL

Jefferson Pinto de Oliveira  
Alexandre do Rosário Casseb  
Anelise de Sarges Ramos  
Sebastião Tavares Rolim Filho  
Henrique Low Nogueira  
Rogério Oliveira Pinho  
Washington Luiz Assunção Pereira

**DOI 10.22533/at.ed.0201929076**

**CAPÍTULO 7 ..... 67**

ESTUDO DO EFEITO DO ÓLEO ESSENCIAL DE MANJERICÃO (*Ocimum basilicum* L.) SOBRE O CARRAPATO BOVINO *Rhipicephalus (Boophilus) Microplus* EM ENSAIOS “IN VITRO”

Jéssica Cassol  
Olívio Bochi Brum  
Daniela Sponchiado

**DOI 10.22533/at.ed.0201929077**

**CAPÍTULO 8 ..... 77**

PROGESTÁGENOS E SEUS EFEITOS COLATERAIS EM GATAS – REVISÃO DE LITERATURA

Roselaine Durão da Silva  
Tamires Rodrigues Perkoski

**DOI 10.22533/at.ed.0201929078**

**CAPÍTULO 9 ..... 87**

PLASTICIDADE ESTRUTURAL E ISOLAMENTO DE CÉLULAS PROGENITORAS DO CORDÃO UMBILICAL DE CUTIAS (*Dasyprocta prymnolopha*) CRIADAS EM CATIVEIRO

Maria Acelina Martins de Carvalho  
Napoleão Martins Argôlo Neto  
Elís Rosélia Dutra de Freitas Siqueira Silva  
Yulla Klinger de Carvalho Leite  
Dayseanny de Oliveira Bezerra  
Maíra Soares Ferraz  
Aírton Mendes Conde Júnior  
Andressa Rêgo da Rocha  
Gerson Tavares Pessoa  
Miguel Ferreira Cavalcante Filho

**DOI 10.22533/at.ed.0201929079**

**CAPÍTULO 10 ..... 104**

PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DE VALOR EM CADEIAS PRODUTIVAS

Marcos Vinícius Araújo  
Camila Elisa Alves  
Glenio Piran Dal' Magro

**DOI 10.22533/at.ed.02019290710**

**CAPÍTULO 11 ..... 114**

EXTENSÃO AGRONÔMICA NA EXPOMAR 2018

Natália Cardoso dos Santos  
Nardel Luiz Soares da Silva  
Jaqueli Vanelli  
Jessyca Vechiato Galassi  
Camila da Cunha Unfried  
Lucas Casarotto  
Giordana Menegazzo da Silva  
Leonardo Mosconi  
Daliana Uemura  
Aline Rafaela Hasper  
Camila Inês Podkowa  
Arthur Kinkas

**DOI 10.22533/at.ed.02019290711**

**CAPÍTULO 12 ..... 122**

MOTIVAÇÃO DOS JOVENS ACADÊMICOS EM BUSCA DA SUCESSÃO FAMILIAR NO MEIO RURAL

Gabriela Carvalho  
Fabiano Nunes Vaz  
Greicy Sofia Maysonave  
Tônia Magali Moraes Brum  
Caroline de Ávila Fernandes  
Paulo Santana Pacheco  
Leonir Luiz Pascoal  
Ana Carolina Teixeira Silveira Cougo  
Ariel Schreiber  
Alessany Machado Navarro

**DOI 10.22533/at.ed.02019290712**

**CAPÍTULO 13 ..... 135**

EMPREENDEDORISMO RURAL EM UMA COMUNIDADE QUILOMBOLA

Jean Carlos Ramos da Silva  
Marcio Arruda Ribeiro Junior  
Denilson de Oliveira Guilherme  
Maria Aparecida Canale Balduino

**DOI 10.22533/at.ed.02019290713**

**CAPÍTULO 14 ..... 146**

AValiação DAS CONdições HigIÊNICO-SANITÁRIAS DOS ALIMENTOS SERVIDOS NOS *FOOD TRUCKS* NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG

Aline Alves Montenegro Freitas  
Nathália Pinheiro Barbosa Souza  
Fernanda Barbosa Borges Jardim

**DOI 10.22533/at.ed.02019290714**



<b>CAPÍTULO 15</b> .....	<b>151</b>
BENEFÍCIOS NUTRICIONAIS DA INSERÇÃO DE ORA-PRO-NÓBIS ( <i>Pereskia aculeata</i> ) NA PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA	
Clistiane Santos Santana Angela Kwiatkowski Amanda Moura Queiros Aparecida Michelle da Silva Souza Ramon Santos Minas Wilson Alex Martins Miranda	
<b>DOI 10.22533/at.ed.02019290715</b>	
<b>CAPÍTULO 16</b> .....	<b>163</b>
DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DE PÃO DE CEBOLA COM ADIÇÃO DE ORA-PRO-NÓBIS	
Rejane de Oliveira Ramos Carla Regina Amorim dos Anjos Queiroz	
<b>DOI 10.22533/at.ed.02019290716</b>	
<b>CAPÍTULO 17</b> .....	<b>172</b>
ELABORAÇÃO E CINÉTICA FERMENTATIVA DE BEBIDA MISTA DE MEL DE ABELHA E PINHA ( <i>Annona squamosa</i> , L.)	
Maria Mikaele da Silva Fernandes Maria Eduarda Dantas Cândido Jonnathan Silva Nunes Dauany de Sousa Oliveira Bruna Lorrane Rosendo Martins Maria Ester Maia Evangelista Juvêncio Olegário de Oliveira Neto Bianca Louise Alves Torres Silva Alfredina Dos Santos Araújo Adriano Sant'Ana Silva	
<b>DOI 10.22533/at.ed.02019290717</b>	
<b>CAPÍTULO 18</b> .....	<b>181</b>
ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO TEMPO E DA TEMPERATURA PARA O FORNEAMENTO DE BISCOITOS	
Rennan de Vasconcelos Correia Pierre Correa Martins	
<b>DOI 10.22533/at.ed.02019290718</b>	
<b>CAPÍTULO 19</b> .....	<b>192</b>
EXPERIÊNCIA NA MONITORIA DAS DISCIPLINAS DE ANÁLISES DE ALIMENTOS DO CCQFA	
Fernanda Mülling Mülling Eduarda Caetano Peixoto Renata Pires Da Silveira Caroline Dellinghausen Borges Rui Carlos Zambiasi Carla Rosane Barboza Mendonça	
<b>DOI 10.22533/at.ed.02019290719</b>	

<b>CAPÍTULO 20</b> .....	<b>200</b>
UM MÉTODO DE AGRUPAMENTO ALTERNATIVO PARA ANÁLISE DE AGRUPAMENTO PARA NÚMERO DE GRUPOS	
Mácio Augusto de Albuquerque Antônio Leopoldo Cardoso Sabino Hiago José Andrade de Albuquerque Martins Lucas Cardoso Pereira Edwirde Luiz Silva Camelo Kleber Napoleão Nunes de Oliveira Barros	
<b>DOI 10.22533/at.ed.02019290720</b>	
<b>CAPÍTULO 21</b> .....	<b>212</b>
O USO AGRÍCOLA DA TERRA NA COMUNIDADE DO BROCA, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ, NORDESTE PARAENSE, AMAZÔNIA ORIENTAL	
Lívia Tálita da Silva Carvalho Alexandre de Souza Fabricio do Carmo Farias Antonio Valmique Alves Da Silva Filho Antonio Michael Pereira Bertino Bianca Cavalcante da Silva Mateus Higo Daves Alves Antonio Maricélio Borges de Souza Jonathan Braga da Silva	
<b>DOI 10.22533/at.ed.02019290721</b>	
<b>SOBRE OS ORGANIZADORES</b> .....	<b>219</b>
<b>ÍNDICE REMISSIVO</b> .....	<b>220</b>

## INFLUÊNCIA DA ESTAÇÃO DO ANO, DO MOMENTO DA INSEMINAÇÃO E DA TEMPERATURA RETAL NA TAXA DE CONCEPÇÃO DE VACAS LEITEIRAS MISTIÇAS

### **Fransérgio Rocha de Souza**

Faculdade de Medicina Veterinária da  
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)  
Uberlândia-MG

### **Carla Cristian Campos**

Faculdade de Medicina Veterinária da  
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)  
Uberlândia-MG

### **Natascha Almeida Marques da Silva**

Faculdade de Medicina Veterinária da  
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)  
Uberlândia-MG

### **Ricarda Maria dos Santos**

Faculdade de Medicina Veterinária da  
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)  
Uberlândia-MG

**RESUMO:** Objetivou-se avaliar o efeito da temperatura retal (TR) sobre a taxa de concepção (TC), bem como da estação do ano (primavera-verão vs. outono-inverno) e do momento da inseminação artificial (IA) (manhã vs. tarde) sobre a TR e a TC de vacas leiteiras mestiças (Holandês x Gir). O experimento foi realizado em uma fazenda leiteira em Centralina, MG, onde foram analisadas 1219 inseminações, convencionais e em tempo fixo. A TR das vacas foi medida imediatamente antes da IA usando termômetro digital. O diagnóstico de gestação foi realizado por ultrassonografia

entre 28 e 60 dias pós-IA. Os efeitos da estação do ano e do momento da IA sobre a TR foram avaliados pelo teste de Mann-Whitney e destas variáveis sobre a TC pelo teste de Qui-quadrado no SAS. A TR média foi de 39,4°C. Vacas com TR  $\geq 39,4^\circ\text{C}$  tiveram TC inferior à de vacas com TR  $< 39,4^\circ\text{C}$  (25,78% vs. 32,54%;  $P = 0,0096$ ). Na primavera-verão as vacas apresentaram TR superior ( $39,44^\circ\text{C} \pm 0,025$  vs.  $39,27^\circ\text{C} \pm 0,022$ ;  $P < 0,0001$ ) e TC inferior (25,49% vs. 31,75%;  $P = 0,0146$ ) em relação ao outono-inverno. Vacas inseminadas pela manhã tiveram menor TR ( $38,96^\circ\text{C} \pm 0,022$  vs.  $39,60^\circ\text{C} \pm 0,018$ ;  $P < 0,0001$ ) e maior TC (32,86% vs. 26,06%;  $P = 0,0102$ ) do que as vacas inseminadas à tarde. Conclui-se que vacas leiteiras mestiças com temperatura retal  $\geq 39,4^\circ\text{C}$  apresentam menor taxa de concepção. A temperatura retal e a taxa de concepção são afetadas pela estação do ano e pelo momento da inseminação.

**PALAVRAS-CHAVE:** eficiência reprodutiva, estresse térmico, inseminação artificial, vacas mestiças

### INFLUENCE OF SEASONALITY, TIMING OF INSEMINATION AND RECTAL TEMPERATURE ON CONCEPTION RATE OF CROSSBRED DAIRY COWS

**ABSTRACT:** This study aimed to evaluate the

effects of rectal temperature (RT) on conception rate (CR), as well as the effects of seasonality (spring-summer vs. autumn-winter) and timing of artificial insemination (AI) (morning vs. afternoon) on RT and CR in crossbred dairy cows (Holstein x Gyr). The experiment was conducted on a dairy farm in Centralina, MG, where 1,219 conventional and fixed time inseminations were analyzed. Cows' RT was measured immediately before AI using a digital thermometer. Pregnancy diagnosis was done using ultrasonography between 28 and 60 days after AI. The effects of seasonality and timing of AI on RT were analyzed using a Mann-Whitney U test, and the effects of these variables on CR were analyzed using a Chi-squared test, both in the SAS program. The RT average was 39.4°C. Cows with RTs  $\geq 39.4^\circ\text{C}$  had lower CR than cows with RTs  $< 39.4^\circ\text{C}$  (25.78% vs. 32.54%;  $P = 0.0096$ ). During spring-summer, cows had higher RTs ( $39.44^\circ\text{C} \pm 0.025$  vs.  $39.27^\circ\text{C} \pm 0.022$ ;  $P < 0.0001$ ) and lower CR (25.49% vs. 31.75%;  $P = 0.0146$ ) compared with autumn-winter. Cows inseminated in the morning had lower RTs ( $38.96^\circ\text{C} \pm 0.022$  vs.  $39.60^\circ\text{C} \pm 0.018$ ;  $P < 0.0001$ ) and higher CR (32.86% vs. 26.06%;  $P = 0.0102$ ) than cows inseminated in the afternoon. In conclusion, crossbred dairy cows with rectal temperature equal to or greater than  $39.4^\circ\text{C}$  had lower conception rate. Moreover, rectal temperature and conception rate were affected by seasonality and insemination time.

**KEYWORDS:** reproduction efficiency, heat stress, artificial insemination, crossbred cows

## 1 | INTRODUCTION

Milk production around the world has increased due to a combination of management improvement, better nutrition and intense genetic selection. However, this progress negatively affects the reproductive efficiency of lactating cows (LUCY, 2001; WASHBURN et al., 2002). In addition, the negative effects caused by heat stress also contribute to reduced reproductive performance in dairy cows.

There is great variation in the temperatures that establish the thermoneutrality zone for bovines. Nããs (1989) showed that temperatures between  $13^\circ\text{C}$  and  $18^\circ\text{C}$  were comfortable for most of the ruminants. Baeta and Souza (1997) mentioned that the comfort zone for adult bovines from European breeds was between  $-1^\circ\text{C}$  and  $16^\circ\text{C}$ . Thermal comfort depends on many factors, especially relative humidity, Temperature and Humidity Index calculation, which was created to evaluate the risk of heat stress according to the USDC-ESSA's (1970) classification, which measures situations from stress absence, slight, moderate, severe stress, or until animal death.

Heat stress is defined as any combination of environmental conditions that leads the temperature to rise above the animal's thermoneutrality zone (THATCHER, 2010). Dairy cows' tolerance to high temperatures is reduced during lactation due to the increase in body temperature as a metabolic response to high feed intake and milk synthesis, which decreases the animal's capacity to loose excess heat (KADZERE et al., 2002). In accordance with these authors, less attention has been

given to the thermoregulation ability of modern dairy cows selected to increase their milk production capacity.

Most crossbred dairy cows managed in Brazil were originated by mating *Bos taurus* and *Bos indicus* animals with the aim of minimizing the detrimental effects of heat stress. This blend combines the high productive potential of *Bos taurus* with the elevated environment temperature resistance of *Bos indicus*. However, crossbred cows selected for high levels of milk production had an increased metabolic response due to greater feed intake and heat production. This can lead to a difficult thermal balance maintenance, showing that these cows are also susceptible to heat stress (AZEVEDO et al., 2005).

Rectal temperature (RT) may be used as a physiologic parameter related to thermal comfort and adaptability of environmental conditions (HEMSWORTH et al., 1995). Dunlap and Vincent (1971) reported a high significant negative correlation between RT and conception rate (CR); thus, an increase in body temperature compromises fertility in cows.

Heat stress negatively affects many physiological processes until pregnancy establishment, such as follicular and early embryonic development (AL-KATANANI et al., 1999), which increases the proportion of failure embryos and, thus, the CR of dairy cows (HANSEN; ARECHIGA, 1999). Moreover, heat stress influences many milk productive parameters, including milk production, quality and composition, leading to economic losses. It is necessary to implement strategies to reduce the effects of heat stress to minimize these losses, as the stress factors are directly related to the reproductive efficiency of dairy herds.

The aim of this study was to evaluate the effect of RT on CR, as well as the effects of seasonality (spring-summer vs. autumn-winter) and artificial insemination (AI) timing (morning vs. afternoon) on RT and CR in crossbred dairy cows.

## 2 | MATERIAL AND METHODS

This study was conducted on a commercial dairy farm located in Centralina, Minas Gerais, Brazil (latitude 18°34'02" S and longitude 49°11'52" W). The weather in this area is classified as tropical, with temperatures varying between 18°C and 38°C, with an annual average of 23°C. The rain period usually occurs from October to March, with an annual average pluviometric index of 1,473 mm. During the experimental period, which occurred between July 2011 and June 2012, 1,219 inseminations were completed.

The herd, composed of crossbred dairy cows (Holstein x Gyr), had an average of 480 lactating cows mechanically milked two times per day with an average milk production of 18.75 liters per cow per day. The farm adopted a vaccination calendar, which included vaccines for foot-and-mouth disease, brucellosis, bovine viral diarrhea

virus, infectious bovine rhinotracheitis and leptospirosis. The animals were also wormed twice a year, with an alternation of the used drugs.

During the rainy season (spring-summer), the animals were kept in rotational grazing patterns on paddocks of Tifton-85 (*Cynodon sp.*) and supplemented with a concentrate made at the farm. Pasture shading was provided by *Eucalyptus* trees planted parallel with fences, which delimitate each paddock. During the dry period (autumn-winter), the cows were kept in a “loosing house” confinement, receiving a total mixed ration (TMR) composed of corn or sorghum silage, which varied by farm availability; the TMR was supplemented with concentrate and minerals. All cows had *ad libitum* access to water and all diets were formulated in accordance with the National Research Council’s recommendations (NRC, 2001).

Reproductive farm management was conducted monthly using ultrasonography equipped with a rectal linear transducer of 7.5 MHz (DP3300vet®, Mindray) to evaluate the uterine and ovarian conditions of the cows after a 30-day voluntary waiting period. During the trial, the same veterinarian did all gynecologic evaluations, including the pregnancy diagnosis.

Primiparous and multiparous cows greater than 30 days post-partum (DPP) with body conditional scores greater than 2.5 according to the scale proposed by EDMONSON et al. (1989) (1 = very skinny and 5 = obese), with good uterine condition and healthy, considering cows without clinical mastitis, lameness and/or digestive disturbances were selected by the same evaluator. Cows were then submitted to one of the two established reproductive management options, according to their ovarian condition.

The first reproductive management option for cows with the presence of a corpus luteum (CL) was an intramuscular (IM) injection of 25 mg (5.0 ml) of PGF<sub>2α</sub> (Lutalyse®, Dinoprost Tromethamine, Zoetis). After this injection, trained employees observed the cows for estrus behavior twice daily for seven days; cows who were in estrus were bred conventionally ±12 hours after estrus detection.

As a second reproductive management option, the cows without a CL were submitted to the following timed artificial insemination (TAI) protocol: Day zero (D0) - insertion of a progesterone slow-release intravaginal device (CIDR®, Zoetis) containing 1.9 grams of progesterone and an IM injection of 2.0 mg (2.0 ml) of estradiol benzoate (Estrogin®, Farmavet); Day 7 - an IM injection of 12.5 mg (2.5 ml) of PGF<sub>2α</sub> (Lutalyse®, Zoetis); Day 9 - intravaginal device withdrawal plus an IM injection of 1.0 mg (0.5 ml) of estradiol cypionate (ECP®, Zoetis); Day 11 - TAI. Cows who showed estrus behavior between days 9 and 11 of the protocol were bred ±12 hours after estrus detection.

The cows greater than 30 DPP, who exhibited estrus signs before being evaluated with an ultrasonography exam or submitted to one of two reproductive managements, as well as the cows who returned in estrus before the expected date of pregnancy diagnosis, were also bred conventionally.

Estrus behavior observation was conducted twice daily: in the morning and in the afternoon for approximately 30 minutes by two farm workers, who were also responsible for the inseminations. RT was measured immediately before each AI using a digital thermometer (G-Tech®). Date and time (morning or afternoon) were recorded for each AI, and the inseminations were done between 7:00 and 9:00 in the morning and between 17:00 and 19:00 at the afternoon. Pregnancy diagnosis was performed between 28 and 60 days post-AI by ultrasonography; cows were considered pregnant if the fetus had a heartbeat.

For statistical analysis, RTs of cows were numerically evaluated and classified as above or below the RT average of the study. As the RT did not meet the assumptions of normality and homogeneity, the effects of seasonality and timing of AI on RT were analyzed with a Mann-Whitney U test. The effects of RT (above or below the average), seasonality (spring-summer vs. autumn-winter) and timing of AI (morning or afternoon) on CR were calculated with a Chi-squared test using the SAS program (SAS, 2001). Statistical differences with levels of  $P \leq 0.05$  were considered significant.

### 3 | RESULTS AND DISCUSSION

The average RT was 39.4°C. Cows with RTs greater than 39.4°C had a 25.78% of CR, and cows with RTs lower than 39.4°C had 32.54% of CR, showing a significant effect ( $P = 0.0096$ ) for the increase of body temperature on the fertility of crossbred dairy cows. A possible explanation for this is that many processes of the reproductive tract, such as the oocyte, CL and early embryonic developments, as well as the endometrium and hypothalamic-pituitary axis functionality, are sensitive to hyperthermia caused by heat stress (WOLFENSON et al. 2000). Embryo development also is compromised when the cow experiences hyperthermia during the estrus day (PUTNEY et al. 1989) or on the day after estrus (EALY et al. 1993).

The mechanism by which heat stress reduces dairy cows' fertility is multifactorial and varies with the intensity (HANSEN; ARECHIGA, 1999). This reduction may be associated with endocrine changes and the follicular microenvironment where the oocytes are exposed, leading to a lower development competence, which denotes the complexity of these mechanisms (ROTH, 2012). As an alternative, to solve the negative effects of high temperatures on reproductive performance, cooling methods should be used, such as sprinkling and ventilation, which can reduce RTs of Holstein cows and, thus, improve CR (WOLFENSON et al 1988).

The CR average was 28.79% (351/1219). The RTs ( $P < 0.0001$ ) and CR ( $P = 0.0146$ ) were affected by seasonality; during the hottest months of the year (spring-summer) crossbred dairy cows had higher RTs and lower CR than the autumn-winter months (Table 1).

Season of the year (n)	Rectal temperature (°C)	Conception rate (%)
Autumn-winter (652)	39.27 ± 0.022	31.75
Spring-summer (567)	39.44 ± 0.025	25.49
<i>P</i> -value	< 0.0001	0.0146

Table 1. Seasonality effect on rectal temperature and conception rate of crossbred dairy cows.

The increase of RT due to the temperature elevation during summer compromises the reproductive efficiency of dairy cows, especially when the animals are from European breeds (*Bos taurus*). Vasconcelos et al. (2011) evaluated RT associated with seasonality seven days after TAI or during fixed time bovine embryo transfer (ET) in Holstein dairy cows and reported that the highest average value of RT occurred during summer. Demétrio et al. (2007) concluded that a high RT measured seven days after AI or during ET had a negative effect on the conception of Holstein dairy cows. Pires et al. (2002) showed higher CR during winter when compared with summer (71.2% vs. 45.7%). However, Campos (2013) did not find an influence of seasonality on CR of Holstein dairy cows submitted to TAI, probably because this author reported a low CR (24.87%) during the entire year.

High environment temperatures, above the bovine thermoneutrality zone, can drastically reduce CR and increase embryonic losses (CAVESTANY et al. 1985). Many studies, also conducted in the Triângulo Mineiro region, discovered that seasonality influenced CR of crossbred dairy cows. According to the results obtained by Barbosa et al. (2011), the CR was higher during autumn-winter when compared to spring-summer (42,5% vs. 25.0%). Ayres et al. (2014) also reported that CR of crossbred dairy cows submitted to TAI was greater during winter than summer (43.7% vs. 26.9%). Thus, even though *Bos indicus* animals have a significantly higher resistance to heat stress, crossbred cows (Holstein x Gyr) also suffer from the negative effects of the elevated environmental temperature.

The time when the inseminations were performed affected both RT ( $P < 0.0001$ ) and CR ( $P = 0.0102$ ) of crossbred dairy cows. Cows inseminated during the morning showed lower RTs and higher CR when compared with the cows bred during the afternoon (Table 2). This may have occurred due to the RTs being greater at the afternoon, which compromises conception because of the increase in cows' body temperature. Dunlap and Vicent (1971) concluded that the elevated RT in response to the high temperature might decrease conception in bovine females. In a study performed in Florida, USA, Thatcher (1974) showed that, when temperature increased from 21 to 35°C, the CR decrease from 40 to 31% in Holstein dairy cows.



Timing of AI (n)	Rectal temperature (°C)	Conception rate (%)
Morning (490)	38.96 ± 0.022	32.86
Afternoon (729)	39.60 ± 0.018	26.06
<i>P</i> -value	< 0.0001	0.0102

Table 2. Timing of artificial insemination (AI) on rectal temperature and conception rate of crossbred dairy cows.

With the aim to improve the milk production of dairy cows in tropical regions, animals that are well-adapted to the environmental conditions should be selected, and cooling tools should be used to ensure thermal comfort. These changes could reduce the magnitude of heat stress and allow cows to produce as expected according to their genetic potential. Another option could be to avoid inseminations during the hottest periods of the year; however, the reproduction seasonal schemes that are usual practices in some regions of the world could lead to economic losses because of milk production scarcity during specific periods of the year (HANSEN; ARECHIGA, 1999).

#### 4 | CONCLUSIONS

Crossbred dairy cows with rectal temperature equal to or above 39.4°C had lower conception rates. Moreover, rectal temperature and conception rate were affected by seasonality and insemination time, which denotes the importance of ensuring thermal comfort to crossbred dairy cows.

#### 5 | ETHICAL COMMITTEE APPROVAL

This research was conducted according to the Ethical Principles in Animal Experimentation, approved by the Committee of Ethics in the Use of Animals (CEUA) of the Federal University of Uberlândia (UFU), protocol number 033/11.

#### REFERENCES

- AL-KATANANI, Y.M.; WEBB, D.W.; HANSEN, P.J. **Factors affecting seasonal variation in 90-day nonreturn rate to first service in lactating Holstein cows in a hot climate.** *Journal of Dairy Science*, Champaign, v.82, p.2611-2616, 1999.
- AYRES, G.F.; BORTOLETTO, N.; MELO JUNIOR, M.; HOOPER, H.B.; NASCIMENTO, M.R.B.M.; SANTOS, R.M. **Efeito da estação do ano sobre a taxa de concepção e perda gestacional em vacas leiteiras mestiças.** *Bioscience Journal*, Uberlândia, v.30, n.2, p.866-872, 2014.
- AZEVEDO, M.; PIRES, M.F.A.; SATURNINO, H.M.; LANA, A.M.Q.; SAMPAIO, I.B.M.; MONTEIRO, J.B.N.; MORATO, L.E. **Estimativa de níveis críticos superiores do índice de temperatura e umidade para vacas leiteiras ½, ¾ e 7/8 Holandês-Zebu em lactação.** *Revista Brasileira de Zootecnia*, Viçosa, v.34, n.6, p.2000-2008, 2005.

- BAETA, F.C.; SOUZA, C.F. **Ambiência em edificações rurais: conforto animal**. 2. Ed. Viçosa: MG, Editora UFV, 1997. 269 p.
- BARBOSA, C.F.; JACOMINI, J.O.; DINIZ, E.G.; SANTOS, R.M.; TAVARES, M. **Inseminação artificial em tempo fixo e diagnóstico precoce de gestação em vacas leiteiras mestiças**. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.40, n.1, p.79-84, 2011.
- CAMPOS, C.C. **Fatores que afetam as taxas de concepção e detecção do estro de retorno após a IATF em vacas holandesas**. Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias) UFU, Uberlândia, 2013.
- DEMÉTRIO, D.G.B.; SANTOS, R.M.; DEMÉTRIO, C.G.B.; VASCONCELOS, J.L.M. **Factors affecting conception rates following artificial insemination or embryo transfer in lactating Holstein cows**. Journal of Dairy Science, Champaign, v.90, p.5073-5082, 2007.
- DUNLAP, S.E.; VINCENT, C.K. **Influence of postbreeding thermal stress on conception rate in beef cattle**. Journal of Animal Science, Champaign, v.32, n.6, p.1216-1218, 1971.
- EALY, A.D.; DROST, M.; HANSEN, P.J. **Developmental changes in embryonic resistance to adverse effects of maternal heat stress in cows**. Journal of Dairy Science, Champaign, v.76, n.10, p.2899-2905, 1993.
- EDMONSON, A.J.; LEAN, I.J.; WEAVER, L.D. **A body condition scoring chart for Holstein dairy cows**. Journal of Dairy Science, Champaign, v.72, n.1, p.68-78, 1989.
- HANSEN, P.J.; ARECHIGA, C.F. **Strategies for managing reproduction in the heat-stressed dairy cow**. Journal of Animal Science, Champaign, v.77, p.37-50, 1999.
- HEMSWORTH, P.H.; BARNETT, J.L.; BEVERIDGE, L.; MATTHEWS, L.R. **The welfare of extensively managed dairy cattle: a review**. Applied Animal Behaviour Science, v.42, n.3, p.161-182, 1995.
- KADZERE, C.T.; MURPHY, M.R.; SILANIKOVE, N.; MALTZ, E. **Heat stress in lactating dairy cows: a review**. Livestock Production Science, Amsterdam, v.77, p.59-91, 2002.
- LUCY, M.C. **Reproductive loss in high-producing dairy cattle: where will it end?** Journal of Animal Science, Champaign, v. 84, p.1277-1293, 2001.
- NÃÃS, I. A. **Princípios de conforto térmico na produção animal**. 1. Ed. São Paulo: SP, Editora Ícone, 1989, 183 p.
- NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. **Nutrient requirements of dairy cattle**. 7.ed. Washington, D.C.: National Academic Press, 2001.
- PIRES, M.F.A.; FERREIRA, A.M.; SATURNINO, H.M.; TEODORO, R.L. **Taxa de gestação em fêmeas da raça Holandesa confinadas em free stall, no verão e no inverno**. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v.54, p.57-63, 2002.
- PUTNEY, D.J.; DROST, M.; THATCHER, W.W. **Influence of summer heat stress on pregnancy rates of lactating dairy cattle following embryo transfer or artificial insemination**. Theriogenology, Stoneham, v.31, n.4, p.765-778, 1989.
- ROTH, Z. **Tratamentos hormonais para aumentar a fertilidade em vacas de leite de alta produção durante o verão e o outono, estudos básicos e aplicados**. In: XVI CURSO NOVOS ENFOQUES NA PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO DE BOVINOS, Anais...Uberlândia, 2012. p. 1-13.

SAS. 2001. **SAS/STAT** User's guide (Release 8.2). SAS Inst. Inc., Cary, NC.

THATCHER, W.W. **Effects of season, climate, and temperature on reproduction and lactation.** Journal of Dairy Science, Champaign, v.57, p.360-368, 1974.

THATCHER, W.W.; FLAMENBAUM, I.; BLOCK, J.; BILBY, T.R. **Manejo de estresse calórico e estratégias para melhorar o desempenho lactacional e reprodutivo em vacas de leite.** In: XIV CURSO NOVOS ENFOQUES NA PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO DE BOVINOS, Anais...Uberlândia, 2010. p. 2-25.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE-ESSA. **Livestock hot weather stress.** Central Regional Operations Manual Letter, Kansas City, MO. p. 70-28, 1970.

VASCONCELOS, J.L.M.; SÁ FILHO, O.G.; JUSTOLIN, P.L.T.; MORELLI, P.; ARAGON, F.L.; VERAS, M.B.; SORIANO, S. **Effects of postbreeding gonadotropin treatments on conception rates of lactating dairy cows subjected to timed artificial insemination or embryo transfer in a tropical environment.** Journal of Dairy Science, Champaign, v.94, p.223-234, 2011.

WASHBURN, S.P.; SILVIA, W.J.; BROWN, C.H.; McDANIEL, B.T.; McALLISTER, A.J. **Trends in reproductive performance in southeastern Holstein and Jersey DHI herds.** Journal of Dairy Science, Champaign, v.85, p.244-251, 2002.

WOLFENSON, D.; FLAMENBAUM, I.; BERMAN, A. **Hyperthermia and body energy store effects on estrous behavior, conception rate, and corpus luteum function in dairy cows.** Journal of Dairy Science, Champaign, v.71, n.12, p.3497-3504, 1988.

WOLFENSON, D.; ROTH, Z.; MEIDAN, R. **Impaired reproduction in heat-stressed cattle: basic and applied aspects.** Animal Reproduction Science, Amsterdam, v.60-61, p.535-547, 2000.

## **SOBRE OS ORGANIZADORES**

**JÚLIO CÉSAR RIBEIRO** - Engenheiro-Agrônomo formado pela Universidade de Taubaté-SP (UNITAU); Técnico Agrícola pela Fundação Roge-MG; Mestre em Tecnologia Ambiental pela Universidade Federal Fluminense (UFF); Doutor em Agronomia - Ciência do Solo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Atualmente é Pós-Doutorando no Laboratório de Estudos das Relações Solo-Planta no Departamento de Solos da UFRRJ. Possui experiência na área de Agronomia (Ciência do Solo), com ênfase em ciclagem de nutrientes, nutrição mineral de plantas, fertilidade, química e poluição do solo, manejo e conservação do solo, e tecnologia ambiental voltada para o aproveitamento de resíduos da indústria de energia na agricultura. E-mail para contato: [jcragronomo@gmail.com](mailto:jcragronomo@gmail.com)

**CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS** - Engenheiro-Agrônomo formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Seropédica-RJ; Especialista em Educação Profissional e Tecnológica pela Faculdade de Educação São Luís, Jaboticabal-SP; Mestre em Fitotecnia pela UFRRJ. Atualmente é Doutorando em Fitotecnia na mesma instituição e desenvolve trabalhos com ênfase nos seguintes temas: Produção Vegetal, Horticultura, Manejo de Doenças de Hortaliças. E-mail para contato: [carlosantoniokds@gmail.com](mailto:carlosantoniokds@gmail.com)

## ÍNDICE REMISSIVO

### A

Agricultura 40, 45, 124, 131, 134, 139, 143, 144, 145, 170, 212, 218

Agronomia 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 219

Alimentação 124, 149, 160, 170, 171

Alimentos 122, 124, 125, 126, 149, 157, 160, 161, 170, 179, 181, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 198

### E

Empreendedorismo 134, 135, 144

Estatística 23, 70, 120, 218

Extensão Rural 39, 41, 122

### I

Inseminação 53

### M

Meio Ambiente 11, 17, 21, 22

Meio rural 123

### P

Pecuária 170

Pesca 1, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 24, 25

Produção 41, 180, 186, 212, 219

### S

Solos 218, 219

### V

Veterinária 46, 53, 55, 58, 64, 65, 66, 67, 75, 76, 86, 100, 101, 102, 103, 122, 124, 125, 126

Agência Brasileira do ISBN  
ISBN 978-85-7247-502-0

