

A Produção do Conhecimento na Medicina Veterinária

Valeska Regina Reque Ruiz
(Organizadora)



Atena
Editora
Ano 2019

Valeska Regina Reque Ruiz

(Organizadora)

A Produção do Conhecimento na Medicina Veterinária

Atena Editora
2019

2019 by Atena Editora
Copyright © Atena Editora
Copyright do Texto © 2019 Os Autores
Copyright da Edição © 2019 Atena Editora
Editora Chefe: Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira
Diagramação: Karine Lima
Edição de Arte: Lorena Prestes
Revisão: Os Autores



Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de Atribuição Creative Commons. Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos autores. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais.

Conselho Editorial

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Profª Drª Adriana Demite Stephani – Universidade Federal do Tocantins
Prof. Dr. Álvaro Augusto de Borba Barreto – Universidade Federal de Pelotas
Prof. Dr. Alexandre Jose Schumacher – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília
Prof. Dr. Constantino Ribeiro de Oliveira Junior – Universidade Estadual de Ponta Grossa
Profª Drª Cristina Gaio – Universidade de Lisboa
Prof. Dr. Deyvison de Lima Oliveira – Universidade Federal de Rondônia
Prof. Dr. Edvaldo Antunes de Faria – Universidade Estácio de Sá
Prof. Dr. Eloi Martins Senhora – Universidade Federal de Roraima
Prof. Dr. Fabiano Tadeu Grazioli – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões
Prof. Dr. Gilmei Fleck – Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Profª Drª Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionele delle Figlie di Maria Ausiliatrice
Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense
Profª Drª Keyla Christina Almeida Portela – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
Profª Drª Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Prof. Dr. Marcelo Pereira da Silva – Universidade Federal do Maranhão
Profª Drª Miranilde Oliveira Neves – Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
Profª Drª Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa
Profª Drª Rita de Cássia da Silva Oliveira – Universidade Estadual de Ponta Grossa
Profª Drª Sandra Regina Gardacho Pietrobon – Universidade Estadual do Centro-Oeste
Profª Drª Sheila Marta Carregosa Rocha – Universidade do Estado da Bahia
Prof. Dr. Rui Maia Diamantino – Universidade Salvador
Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande
Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins

Ciências Agrárias e Multidisciplinar

Prof. Dr. Alan Mario Zuffo – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano
Profª Drª Daiane Garabeli Trojan – Universidade Norte do Paraná
Prof. Dr. Darllan Collins da Cunha e Silva – Universidade Estadual Paulista
Profª Drª Diocléa Almeida Seabra Silva – Universidade Federal Rural da Amazônia
Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Prof. Dr. Jorge González Aguilera – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Prof. Dr. Júlio César Ribeiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão
Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará
Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas

Ciências Biológicas e da Saúde

Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás
Prof. Dr. Edson da Silva – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Profª Drª Elane Schwinden Prudêncio – Universidade Federal de Santa Catarina
Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria
Prof. Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará
Profª Drª Magnólia de Araújo Campos – Universidade Federal de Campina Grande
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande

Ciências Exatas e da Terra e Engenharias

Prof. Dr. Adélio Alcino Sampaio Castro Machado – Universidade do Porto
Prof. Dr. Alexandre Leite dos Santos Silva – Universidade Federal do Piauí
Profª Drª Carmen Lúcia Voigt – Universidade Norte do Paraná
Prof. Dr. Eloi Rufato Junior – Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Prof. Dr. Fabrício Menezes Ramos – Instituto Federal do Pará
Prof. Dr. Juliano Carlo Rufino de Freitas – Universidade Federal de Campina Grande
Profª Drª Neiva Maria de Almeida – Universidade Federal da Paraíba
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG)	
P964	A produção do conhecimento na medicina veterinária [recurso eletrônico] / Organizadora Valeska Regina Reque Ruiz. – Ponta Grossa, PR: Atena Editora, 2019. Formato: PDF Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader. Modo de acesso: World Wide Web. Inclui bibliografia ISBN 978-85-7247-652-2 DOI 10.22533/at.ed.522190110 1. Medicina veterinária – Pesquisa – Brasil. I. Ruiz, Valeska Regina Reque. CDD 636.089
Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422	

Atena Editora
Ponta Grossa – Paraná - Brasil
www.atenaeditora.com.br
contato@atenaeditora.com.br

APRESENTAÇÃO

O conhecimento é o ato ou efeito de conhecer, na Medicina Veterinária este conhecimento é adquirido a partir da graduação (ensino), da pesquisa e da extensão, abrangendo conteúdos básicos, comuns a muitos cursos da área de saúde e agrárias (como biologia celular, bioestatística, biofísica, sociologia, entre outras) e conteúdo específico da profissão. Este conhecimento adquirido em sala é aplicado em campo através das práticas e da pesquisa, onde podemos unir o ensino com a prática, registrando nossos achados em artigos, daí vem a importância dos relatos de caso, onde buscamos passar aos leitores nossa experiência com algo novo ou diferente do que normalmente vemos no nosso dia-a-dia.

Desta forma este e-book traz uma compilação de capítulos sobre esta produção de conhecimento na Medicina Veterinária, trazendo relatos de casos, pesquisas e formas de ensino, aproveite para aperfeiçoar seu conhecimento e adquirir novos.

Bons estudos!

Valeska Regina Reque Ruiz

SUMÁRIO

I. ANIMAIS SILVESTRES

CAPÍTULO 1 1

A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DO PERFIL SANITÁRIO PARA OS CARNÍVOROS SILVESTRES:
REVISÃO DE LITERATURA

Luana Cristina Correia Gonçalves
Beatriz Filgueira Bezerra
Daniel Silva De Araújo
Ana Caroline Calixto Campina
Camila Cristina Rio Preto Martins De Sousa
Talisson De Jesus Costa Conceição
Soraia Alves Buarque
Elias Costa Ferreira Junior
Elizângela Pinheiro Pereira
Lianne Pollianne Fernandes Araújo Chaves
Tadeu Gomes De Oliveira
Alana Lislea De Sousa

DOI 10.22533/at.ed.5221901101

CAPÍTULO 2 7

AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS VITAIS DE *BRADYPUS VARIEGATUS* EM REABILITAÇÃO NO
ESTADO DE PERNAMBUCO

Jonathan Martins de Freitas
Camila Soares Vasconcelos Rocha
Cassia de Freitas Andre
Taciana Cássia Santos Bezerra
Dênisson da Silva e Souza
Nathália Fernanda Justino de Barros
Vanessa Maranhão Soares

DOI 10.22533/at.ed.5221901102

CAPÍTULO 3 16

BEACH MOUSE (*PEROMYSUS POLIONOTUS TRISSYLLEPSIS*) SUBMETIDO À ENUCLEAÇÃO:
CONSIDERAÇÕES ANESTÉSICAS

Rochelle Gorczak
Thaline Segatto
Marília Avila Valandro
Bruna Zafalon-Silva

DOI 10.22533/at.ed.5221901103

CAPÍTULO 4 22

PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E O DESEMPENHO DE COELHOS NOVA ZELÂNDIA SOB
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DA REGIÃO SUL DO PIAUÍ

Denise Christine Ericeira Santos
Cecília Andrade Sousa
Natanael Pereira da Silva Santos
Daniel Biagiott
Warlen Oliveira dos Anjos
Paulo Henrique Ribeiro Alves
Estela dos Santos Silva
Jackson Ramon Quadros Brandão
Alexandre de Sousa Silva

DOI 10.22533/at.ed.5221901104

II. ANIMAIS DE PRODUÇÃO

CAPÍTULO 5 32

BEM ESTAR ANIMAL E ABATE HUMANITÁRIO EM BOVINOS

Francisco Glauco de Araújo Santos
Reginaldo da Silva Francisco
Henrique Jorge de Freitas
Ângela Maria Fortes de Andrade

DOI 10.22533/at.ed.5221901105

CAPÍTULO 6 44

COMPARAÇÃO ENTRE A ANÁLISE CITOLÓGICA (CYTOBRUSH) E HISTOPATOLÓGICA PARA DIAGNÓSTICO DE ENDOMETRITE SUBCLÍNICA EM BOVINOS

Larissa Marchiori Sena
Ítalo Câmara de Almeida
Nara Clara Lazaroni e Merchid
Carla Braga Martins

DOI 10.22533/at.ed.5221901106

CAPÍTULO 7 50

EFEITO DA ADIÇÃO DE GLICERINA BRUTA NA DIETA DE VACAS DE LEITE SOBRE O CONSUMO DE ALIMENTO

Denize da Rosa Fraga
Ana Paula Huttra Kleemann
Emerson André Pereira
Eliana Burtet Parmeggiani
Jonas Itilo Baroni
Julio Viégas

DOI 10.22533/at.ed.5221901107

CAPÍTULO 8 58

IMPACTO ECONÔMICO DA IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE BEM ESTAR NA PRODUÇÃO ANIMAL

Camila Raineri
Beatriz Queiroz dos Reis

DOI 10.22533/at.ed.5221901108

CAPÍTULO 9 75

TÉCNICA DE CONSERVAÇÃO ANATÔMICA E HISTOLÓGICA DO SISTEMA CARDIOVASCULAR SUÍNO

Itatiani Olinda Balancelli
André Roberto Scolari
Tarlis Urbano Fontana
Laura Pegoraro
Nadine Bortoloto
Andiara Wrzesinski
Elisandra Andreia Urío
Daniela dos Santos de Oliveira
Mauro Antonio Almeida
Alan Eduardo Bazzan

DOI 10.22533/at.ed.5221901109

III. AVES

CAPÍTULO 10 86

DESEMPENHO ZOOTÉCNICO DE FRANGOS DE CORTE DE LINHAGEM CAIPIRA CRIADOS SOB CONDIÇÕES DE VERÃO AMAZÔNICO

Ângela Maria Fortes de Andrade
Marcelo Bastos Cordeiro
Francisco Glauco de Araújo Santos
Tallison Filipe Lima
Reginaldo da Silva Francisco
Henrique Jorge de Freitas

DOI 10.22533/at.ed.52219011010

CAPÍTULO 11 98

DESEMPENHO ZOOTÉCNICO E RENDIMENTO DE CARCAÇA DE LINHAGENS DE FRANGOS DE CORTE CRIADAS SOB CONDIÇÕES AMBIENTAIS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL

Gilcineide Araújo Pires
Marcelo Bastos Cordeiro
Henrique Jorge de Freitas
Suelen Ferreira da Costa Rodrigues
Antonia Mariana do Nascimento

DOI 10.22533/at.ed.52219011011

CAPÍTULO 12 110

EFEITO DO USO DE ADITIVO QUÍMICO E DA TAXA DE LOTAÇÃO SOBRE O DESEMPENHO E CARACTERÍSTICAS DE CARCAÇA DE FRANGOS DE CORTE

Joyce de Jesus Mangini Furlan
Lenise de Freitas Mueller
Adrielle Matias Ferrinho
Maísa de Lourdes do Nascimento Furlan
Mariana Zanata
Marina Colucci Izeppi
Fernando Baldi
Angélica Simone Cravo Pereira

DOI 10.22533/at.ed.52219011012

CAPÍTULO 13 121

REDUÇÃO DOS NIVEIS DE VITAMINA D3 EM PREMIX E SUPLEMENTAÇÃO COM 1,25(OH)2D3 NA RAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE

Osvanira dos Santos Alves
Ligia Fatima Lima Calixto
Karoll Andrea Alfonso Torres-Cordido
Túlio Leite Reis
Felipe Dilelis de Resende Sousa

DOI 10.22533/at.ed.52219011013

IV. PEQUENOS ANIMAIS

CAPÍTULO 14 133

ABORDAGEM ANESTÉSICA EM CÃES BRAQUICEFÁLICOS

Saulo Ferreira Pujol
Rochelle Gorczak
Marília Avila Valandro

DOI 10.22533/at.ed.52219011014

CAPÍTULO 15	148
ANESTESIA PARA CESARIANA EM CADELAS	
Erica Emerenciano Albuquerque Jéssica Monteiro Queiroz de Medeiros	
DOI 10.22533/at.ed.52219011015	
CAPÍTULO 16	153
ESOFAGOTOMIA TRANSTORÁCICA EM UM CÃO: RELATO DE CASO	
Diogo Joffily Paloma Helena Sanches da Silva Patrícia Maria Coletto Freitas Christina Malm Bianca Moreira de Souza Fernanda Martins de Castilho Fonseca Vitória de Paula Fonseca Cavedagne Rafael Augusto de Melo Vieira Amanda Oliveira Paraguassú	
DOI 10.22533/at.ed.52219011016	
CAPÍTULO 17	158
EXCISÃO CIRÚRGICA DE CISTOS PERIRENAIS E MARSUPIALIZAÇÃO DA CÁPSULA RENAL EM GATO SENIL – RELATO DE CASO	
Leticia Matos de Rezende Filipe Curti	
DOI 10.22533/at.ed.52219011017	
CAPÍTULO 18	163
GATO MACHO (<i>FELIS CATUS</i>) CÁLICO/TRICOLOR - RELATO DE CASO	
Marcela Caroline Brasileiro da Silva Horrana Andressa da Silva Rodrigues Amanda Ellen Pessoa Cabral Caoan Iuri de Brito Silva Dominique Oliveira Cavalcante Ividy Bison Rodrigo Gomes de Sousa Rayssa Kuster Klabunde Diana Tramuja Igor Mansur Muniz	
DOI 10.22533/at.ed.52219011018	
CAPÍTULO 19	168
GLAUCOMA E BUFTALMIA EM FELINO COM CARACTERÍSTICAS PATOLÓGICAS DE COLAPSO DE CÂMARA ANTERIOR – RELATO DE CASO	
Andrea Kuner Leandro Bertoni Cavalcanti Teixeira Rayssa Faleiro Marcos Vinícius M. Vianna	
DOI 10.22533/at.ed.52219011019	

CAPÍTULO 20 172

LENTIGO CANINO EM MUCOSA ORAL – RELATO DE CASO

Marcela Caroline Brasileiro da Silva
Horrana Andressa da Silva Rodrigues
Amanda Ellen Pessoa Cabral
Caoan Iuri de Brito Silva
Rayssa Kuster Klabunde
Dirceu Guilherme de Souza Ramos
Henrique Trevizoli Ferraz
Leuton Scharles Bonfim
Klaus Casaro Saturnino

DOI 10.22533/at.ed.52219011020

CAPÍTULO 21 177

LEUCEMIA MASTOCÍTICA E MASTOCITEMIA EM CÃO – RELATO DE CASO

Rossana Priscilla de Souza Figueira
Ana Laysla Frota Machado
Mariah Gois Ceregatti
Lucas Drumond Bento
Frederico Bruno Tavares da Mata Alves dos Reis
Gleidice Eunice Lavalle
Paulo Ricardo de Oliveira Paes
Fabiola de Oliveira Paes Leme

DOI 10.22533/at.ed.52219011021

CAPÍTULO 22 180

LINFOMA CUTÂNEO EM CANINO DA RAÇA CHOW CHOW: RELATO DE CASO

Antonio Augusto Nascimento Machado Junior
Thullyo Alex Flores
Éverton Almeida Pereira
Manoel Lopes da Silva Filho
Larissa Maria Feitosa Gonçalves
Wagner Costa Lima
Denise Cerqueira de Sousa
Isael de Sousa Sá
Sávio Matheus Reis de Carvalho
Felicianna Clara Fonseca Machado

DOI 10.22533/at.ed.52219011022

CAPÍTULO 23 188

PACIENTE COM SARCOMA INDIFERENCIADO CUTÂNEO APRESENTANDO SOBREVIDA MAIOR QUE 500 DIAS PÓS-OPERATÓRIO SEM RECIDIVA

Camila Maximiano Queiroz
Rômulo Vitelli Rocha Peixoto
Paulo de Tarso Guimarães da Silva
Ryan Nunes de Sá
Nayara Oliveira Gabriel
Taynara Beraldo Costa

DOI 10.22533/at.ed.52219011023

CAPÍTULO 24 190

PERCEPÇÃO DOS TUTORES DE CÃES E GATOS ATENDIDOS NO SETOR DE CIRURGIA DO HOVET-UFRA SOBRE CONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS

Claudio Douglas de Oliveira Guimarães

Maridelzira Betânia Moraes David

Luiz Fernando Moraes Moreira

DOI 10.22533/at.ed.52219011024

CAPÍTULO 25 201

TRICOEPITELIOMA MALIGNO EM CÃO: RELATO DE CASO

Barbara Schreider

Francieli Alexandre Gomes

Ellen Cristina Siepmann

Amanda Voltarelli Gomes

Tháisa Regina Fleck

Aline de Marco Viott

DOI 10.22533/at.ed.52219011025

CAPÍTULO 26 206

USO DA TELA DE POLIPROPILENO PARA CORREÇÃO DE FRATURA COMINUTIVA EM OSSOS FRONTAIS ASSOCIADA A RETALHO DE AVANÇO EM FELINO - RELATO DE CASO

Daniella Kaísa de Oliveira Bezerra

Carlos Cesar Rodrigues de Oliveira

Bruno Rocha Martins

Sabine Carola Hilbert

Gessiane Pereira da Silva

Ana Estelita Nascimento de Carvalho

Adriana E. Barbosa

Savilly da Silva Coutinho

Allan Rodrigo do Rosário

Maria Jeane da Silva Cavalcante

Fabírcia Geovânia Fernandes Filgueira

DOI 10.22533/at.ed.52219011026

V. EQUINOS

CAPÍTULO 27 208

FIBROSSARCOMA CUTÂNEO EM EQUINO - RELATO DE CASO

Tháís Rodrigues

Alline Dayse Veloso de Oliveira

Núbia Nayara Pereira Rodrigues

DOI 10.22533/at.ed.52219011027

CAPÍTULO 28 210

TERAPIA COM ONDAS DE CHOQUE (*SHOCKWAVE*) NA DESMITE DO LIGAMENTO ACESSÓRIO INFERIOR (*CHECK LIGAMENT*) EM EQUINO – RELATO DE CASO

Maria Luiza Machado Pereira

Miguel Dalçoquio Nunes Neto

Jéssica Pinheiro Feliciano do Nascimento

Lídia Dornelas de Faria

Jéssica Rodrigues da Silva Meirelles

Luis Fagner da Silva Machado

Karla Steiner

DOI 10.22533/at.ed.52219011028

CAPÍTULO 29 214

UROLÍTIASE COM URETROTOMIA EM EQUINO – RELATO DE CASO

Maria Luiza Machado Pereira
Giovani Lemes Barbosa
Milena Gimenez Valente
Monalisa Lukascek de Castro
Peterson Triches Dornbusch
Luis Fagner da Silva Machado

DOI 10.22533/at.ed.52219011029

VI. ENSINO

CAPÍTULO 30 219

SUCESSO PROFISSIONAL E MARKETING PESSOAL PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS DE MEDICINA VETERINÁRIA

Juliana Ferreira de Almeida
Ismar Araújo de Moraes

DOI 10.22533/at.ed.52219011030

CAPÍTULO 31 226

STAPHYLOCOCCUS AUREUS EM ARROZ, FEIJÃO E FARINHA DE MANDIOCA COMERCIALIZADOS A GRANEL EM MERCADOS PÚBLICOS

Marcielly Batista da Silva
Iuliana Marjory Martins Ribeiro
Laylson da Silva Borges
Joilson Ferreira Batista
Fernanda Samara Barbosa Rocha

DOI 10.22533/at.ed.52219011031

SOBRE A ORGANIZADORA..... 234

ÍNDICE REMISSIVO 235

DESEMPENHO ZOOTÉCNICO E RENDIMENTO DE CARÇAÇA DE LINHAGENS DE FRANGOS DE CORTE CRIADAS SOB CONDIÇÕES AMBIENTAIS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL

Gilcineide Araújo Pires

Universidade Federal do Acre. Rio Branco, Acre

Marcelo Bastos Cordeiro

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Instituto de Ciências Agrárias. Unaí, Minas Gerais

Henrique Jorge de Freitas

Universidade Federal do Acre. Rio Branco, Acre

Suelen Ferreira da Costa Rodrigues

Universidade Federal do Acre. Rio Branco, Acre

Antonia Mariana do Nascimento

Universidade Federal do Acre. Rio Branco, Acre

RESUMO: Objetivou-se avaliar o efeito do microclima sobre o desempenho zootécnico e o rendimento de carcaça de duas linhagens comerciais de frangos de corte criadas nas condições ambientais da Amazônia ocidental. Foram utilizados 280 frangos das linhagens Cobb e Ross, distribuídas em delineamento de blocos ao acaso, considerando o sexo como o critério de blocagem, composto de dois tratamentos e sete repetições. As comparações entre médias das variáveis foram feitas pelo teste F, a 5% de probabilidade. No decorrer do experimento, a cada sete dias, foram analisados os parâmetros: peso vivo, o consumo de ração, a conversão alimentar, a eficiência alimentar e a viabilidade. Aos 63 dias, foram selecionadas 10% de cada parcela das aves para avaliação de rendimento

de carcaça. Durante o período experimental foram feitas leituras de temperatura e umidade relativa do ar para caracterização do microclima, as quais foram submetidas a análise por meio do software Pro HOBOWare®. Observou-se uma grande oscilação de temperatura do ar e umidade relativa. A linhagem Cobb teve peso vivo superior à linhagem Ross, a partir dos 21 dias de idade e maior consumo de ração a partir dos 28 dias. Nos parâmetros de conversão alimentar, eficiência alimentar e viabilidade, não houve efeito das linhagens. Não houve diferenças significativas entre as linhagens em termos de rendimento de carcaça. Baixas temperaturas de conforto durante as primeiras semanas e altas temperaturas de conforto nas semanas subsequentes, associadas a grande oscilação da umidade relativa do ar, prejudicaram o desempenho e o rendimento produtivo dos frangos.

PALAVRAS-CHAVE: Ambiente, Aves, Temperatura, Umidade Relativa.

PRODUCTION PERFORMANCE AND CARCASS YIELD OF TWO BROILER LINES REARED UNDER THE ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF WESTERN AMAZON

ABSTRACT: The aim of this study was to evaluate the effect of microclimate on production performance and carcass yield of two lines of

commercial broilers reared in the environmental conditions of western Amazon. A total of 280 hens of the Cobb and Ross lines were distributed in a randomized block design, in which the sex was considered the block factor, with two treatments and seven replicates per treatment. The evaluated parameters were live weight, feed intake, feed conversion, feed efficiency, and viability. At 63 days, 10% of the birds from each plot were selected for an evaluation of carcass yield, prime cuts, abdominal fat content, and edible viscera. During the experimental period, temperature and relative humidity readings were obtained to characterize the microclimate. A large variation was observed in air temperature and relative humidity throughout the experimental period. The Cobb line had a higher live weight than the Ross line from 21 days of age, and lower feed intake after 28 days of age. No effect of lines was detected on the feed conversion, feed efficiency, or viability parameters. There were no significant differences between the lines in terms of carcass yield, edible viscera, prime cuts, or abdominal fat. Low comfort temperatures during the first weeks and high comfort temperatures in the subsequent weeks, associated with a high fluctuation of the air relative humidity, compromised the production performance of the broilers.

KEYWORDS: Ambience, birds, relative humidity, temperature.

1 | INTRODUÇÃO

A avicultura de corte no Brasil visa à máxima produtividade de carne com menor custo e tempo de produção reduzido. Dessa forma, busca-se conciliar o uso de aves geneticamente melhoradas, dietas balanceadas nutricionalmente, com um ambiente de criação termicamente adequado às necessidades das aves.

Os programas de melhoramento genético necessitam de constantes informações referentes a ganho de peso, a conversão alimentar e a viabilidade de cada linhagem e de seus cruzamentos. A partir da avaliação dessas características é possível a melhoria do material genético dos frangos de corte. Os métodos empregados para verificar a eficiência produtiva são os fatores que definem a qualidade da linhagem (API et al., 2017).

Na produção de frangos de corte, as linhagens predominantes apresentam características de velocidade de crescimento e rendimento de carne (LITZ et al., 2014). Além do metabolismo acelerado, possuem uma baixa eficiência nos mecanismos de perda de calor, para diminuir a temperatura corpórea. São animais homeotérmicos e quando expostos a altas temperaturas, reduzem a ingestão de alimento, que conseqüentemente, prejudica a taxa de crescimento e o rendimento produtivo (DA COSTA et., 2017).

As aves procuram controlar sua temperatura corporal através de mecanismos comportamentais e fisiológicos. Entretanto, nas primeiras semanas de vida, estas não apresentam o sistema termorregulador completamente desenvolvido (CORDEIRO et al., 2010). Dessa forma, se forem inseridas em ambientes com condições de estresse

térmico, ocorrerá um desperdício de energia que será gasto na termorregulação (LI et al., 2015).

No Brasil, que apresenta clima tropical, a produção avícola enfrenta constante conflito com as condições ambientais, mais especificamente com o calor acima do nível de conforto dos animais. No caso da região Amazônica, as temperaturas médias elevadas e alta umidade durante a maior parte do ano (MARQUES et al., 2017), comprometem o processo respiratório das aves, influenciando negativamente na troca de calor com o ambiente.

Para verificar se o ambiente de criação é favorável ao conforto térmico das aves, é necessário avaliar as respostas produtivas, fisiológicas e comportamentais. O frango de corte quando submetido a diferentes intensidades e durações de estresse, pode variar o consumo de ração e de água, ganho de peso e a conversão alimentar.

Assim, a escolha de linhagens cada vez mais adaptadas às regiões de clima tropical e instalações que proporcionam ainda mais conforto aos animais são fundamentais para o progresso da atividade avícola. Sem falar no manejo, que diminui os efeitos negativos do ambiente sobre as aves, e estes devem ser seguidos, a fim de aumentar a produção avícola nacional.

Nesse contexto, este trabalho objetivou avaliar o desempenho zootécnico e os rendimentos de carcaça e cortes de duas linhagens comerciais de frangos de corte, a fim de identificar quais das linhagens estudadas proporcionam maiores vantagens de produção na região Amazônia ocidental.

2 | MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no Setor de Avicultura da Universidade Federal do Acre, em Rio Branco, Acre, no período de 21 de julho a 23 de setembro de 2016. Todos os procedimentos realizados neste experimento foram aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de animais (CEUA) da Universidade Federal do Acre – UFAC, Rio Branco, Acre, Protocolo nº 91/2015.

Os frangos foram alojados, em um galpão experimental com dimensões de 80 m², dividido em 32 boxes, cada um com as dimensões de 2,0 m²; piso e muretas laterais de concreto, pilares e tesoura de madeira, cercado com tela de arame, bem como as divisórias internas; orientação Leste-Oeste; pé direito de 2,8 m, cobertura de alumínio e lanternim de fibrocimento.

Para caracterização das condições climáticas do microclima, foram realizadas medições de temperatura e umidade relativa do ar em dois pontos do galpão, utilizando dataloggers conjugados Hobos, da empresa ONSET Corp, em intervalos de 15 minutos, durante todo o período experimental. Posteriormente, os dados foram submetidos a análise por meio do software Pro HOBOWare®, o que resultou na média de temperatura e umidade relativa do ar do período experimental correspondente a cada semana.

Foram utilizados 280 frangos das linhagens Cobb e Ross, machos e fêmeas. As aves foram distribuídas em delineamento de blocos ao acaso, considerando o sexo como o critério de blocagem, composto de dois tratamentos (linhagens: Cobb e Ross) e sete repetições.

Cada boxe, alojou 10 aves (5 aves/m²), foi equipado com um comedouro tubular, um bebedouro semiautomático. As aves receberam rações isonutritivas e isoenergética, seguindo as recomendações nutricionais das aves de acordo com o Rostagno et al. (2011), conforme a fase. O manejo produtivo foi realizado duas vezes ao dia, mantendo água limpa e ração à vontade.

Durante a condução do experimento procedeu-se à pesagem das aves e das rações no 7º, 14º, 21º, 28º, 35º, 42º, 49º, 56º e 63º dia de idade para avaliação do desempenho zootécnico. Calcularam-se o peso vivo (PV), o consumo de ração (CR), a conversão alimentar (CA), a eficiência alimentar (EA) e a viabilidade (V). O número de aves mortas foi registrado diariamente, sendo a porcentagem calculada em relação ao número inicial de aves alojadas, para mensuração da viabilidade.

Aos 63 dias, foram selecionadas 10% das aves de cada parcela das aves para avaliação de rendimento de carcaça. O rendimento de carcaça (sem cabeça, pés e vísceras comestíveis) foi determinado em relação ao peso ao vivo (após jejum de 12 horas) e o rendimento de cortes nobres (peito, coxas e sobrecoxas). Teor de gordura abdominal, sendo considerada a gordura presente na região da cloaca e aquela aderida a moela e rendimento de vísceras (intestino, fígado, coração e moela) em relação ao peso da carcaça eviscerada.

As comparações entre médias das variáveis foram feitas pelo teste F, a 5% de probabilidade. As análises estatísticas das variáveis estudadas foram feitas utilizando-se o programa SISVAR versão 5.6 (Sistema para Análise Estatística), desenvolvido por Ferreira (2014).

3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da temperatura do ar e da umidade relativa do ar e as respectivas faixas de conforto das aves estão apresentados nas Figuras 1 e 2.




FIGURA 1. Temperatura do ar (°C) no interior do galpão, durante todo o período experimental.

Observa-se que a temperatura do ar oscilou durante o dia, fazendo com que as aves ficassem na faixa do conforto térmico, somente num intervalo estreito do tempo. Na primeira semana, as aves sofreram mais com estresse por frio, ficando a maior parte do tempo submetida às temperaturas inferiores 32 °C. Observa-se também, na primeira semana e em determinados períodos, temperaturas superiores ao limite recomendado de 34 °C (SCHIASSI et al., 2015), podendo induzir hipertermia com desidratação nos pintinhos, levando a redução no consumo de ração e atraso no crescimento (CORDEIRO et al., 2010).

Segundo Cordeiro et al. (2010), as aves nos primeiros dias de vida expostas às temperaturas baixas e fora da zona de conforto térmico, poderão apresentar menor ganho de peso, de difícil recuperação nas fases de crescimento e engorda, além de resultar em desuniformidade do lote.

Na segunda e terceira semanas de vida das aves, a condição de estresse por frio vai diminuindo, sendo que a partir da quarta semana, observa-se situações de intenso estresse calórico. A queda no consumo de ração pelas aves e a produção de carne estão intimamente relacionadas com as condições térmicas ambientes (CASSUCE et al., 2013; SCHIASSI et al., 2015).

De acordo com Baêta e Souza (2010), o ambiente considerado confortável para frangos adultos com 35 dias, apresenta temperatura entre 18 a 28 °C, sendo a temperatura crítica inferior aos 15 °C e temperatura crítica superior aos 32 °C. A umidade relativa do ar ideal varia entre 50 e 70% (TINÔCO, 2001).




FIGURA 2. Umidade relativa do ar (%) no interior do galpão, durante todo o período experimental.

Observa-se uma grande oscilação relacionada à umidade relativa do ar. O período experimental de julho a setembro é caracterizado como verão amazônico, no qual se destaca por ser um período com média a baixa pluviosidade. Por isso, pode-se observar a ocorrência de valores de até 25% de umidade relativa do ar.

Valores de umidade superiores a 70% têm relação inversa com a perda de calor (TINÔCO; GATES, 2005). Quanto maior a umidade relativa, maior a dificuldade da ave em perder calor latente por evaporação, comprometendo o seu desenvolvimento produtivo. Os resultados de desempenho zootécnico dos frangos de corte estão apresentados na Tabela 1.

Linhagem	Período								
	1-7	1-14	1-21	1-28	1-35	1-42	1-49	1-56	1-63
	Peso Vivo (Kg)								
Cobb	0,09	0,20	0,38a	0,60a	0,78a	1,05a	1,40a	1,72a	2,12a
Ross	0,09	0,19	0,35b	0,55b	0,70b	0,95b	1,28b	1,60b	1,98b
CV(%)	4,64	5,75	7,99	9,48	11,24	10,18	9,73	9,05	7,55
	Consumo de Ração (Kg)								
Cobb	0,10	0,32a	0,67	1,13a	1,72a	2,40a	3,19	4,05a	5,18
Ross	0,09	0,31b	0,63	1,05b	1,56b	2,14b	2,96	3,74b	4,83
CV(%)	6,33	6,19	7,49	8,78	11,43	10,73	11,5	8,16	9,41
	Conversão Alimentar								
Cobb	1,00	1,61	1,76	1,88	2,20	2,28	2,27	2,35	2,43
Ross	1,00	1,58	1,79	1,90	2,23	2,26	2,30	2,33	2,43
CV(%)	3,78	3,26	3,22	4,22	7,21	8,43	7,75	6,94	6,89
	Eficiência Alimentar (%)								
Cobb	99,8	62,1	56,8	52,9	45,4	43,9	44,1	42,7	41,1
Ross	100	63,1	55,8	52,5	45,0	44,5	43,5	43,0	41,2
CV(%)	3,80	3,20	3,20	4,15	6,65	8,16	8,19	7,73	6,88
	Viabilidade (%)								
Cobb	100	99	99	99	95	95	95	95	92
Ross	100	100	98	97	95	92	92	91	88
CV(%)	0,00	1,9	3,26	3,68	5,95	7,04	7,98	7,66	9,96

^(*)Médias seguidas de letras diferentes na coluna, diferem significativamente entre si, pelo teste F ao nível de 5% de probabilidade.

TABELA 1 - Peso vivo e consumo de ração acumulados e conversão alimentar, eficiência e viabilidade, segundo a linhagem de frangos de corte, avaliados em cada período (*).

As aves da linhagem Cobb apresentaram maior peso vivo aos 21 dias de idade até o período final de criação, quando comparados aos da linhagem Ross. Este dado infere que as aves da linhagem Cobb apresentam um crescimento inicial semelhante às aves da linhagem Ross e que, posteriormente, apresentam um ganho evidenciado pelo crescimento superior e pela diferença significativa até o final do período experimental. Esses resultados confirmaram os já relatados por Tona et al. (2010), que observaram maior precocidade na taxa de crescimento de frangos da linhagem Cobb quando comparados com os da linhagem Ross.

No geral, um padrão diferencial de desenvolvimento entre as duas linhagens pode estar relacionado a diferenças no processo de eclosão e crescimento pós-natal precoce (TALEBI et al., 2005).

Stringhini et al. (2003), avaliaram o desempenho zootécnico das linhagens Ross, Cobb, Arbor Acres e Avian Farms, concluindo que não houve efeito da linhagem no peso das aves nos períodos avaliados.

Diferenças no peso vivo entre linhagens foram observadas por, Garcia Neto e Campos (2004), constataram que as aves da linhagem Cobb, cujo peso inicial de pintinhos no alojamento foi maior, não mantiveram diferença favorável inicial apresentando menor peso ao término do experimento, comparada à da linhagem Ross.

O consumo de ração foi superior para as aves da linhagem Cobb nos períodos de 28, 35, 42 e 56 dias. Observa-se que o consumo no período final de criação (Tabela 1), das aves, 5,185 Kg e 4,830 Kg, Cobb e Ross, respectivamente, estão abaixo do recomendado 7,451 Kg, conforme o Suplemento (2013). Dessa forma, pode-se inferir que o consumo de alimentos se correlaciona negativamente com a temperatura ambiente, haja vista, que as aves reduzem a ingestão de alimentos na tentativa de diminuir o calor gerado pelos processos metabólicos (PONCIANO et al., 2012).

Os dados desse estudo referentes ao consumo de ração, corroboram com a pesquisa de Dalólio et al. (2016), que caracterizando as condições bioclimáticas de um galpão experimental de frangos de corte, verificaram que as aves não permaneceram em conforto térmico durante todo o período de criação, apresentando desempenho zootécnico abaixo do esperado, com consumo de ração de 4,188 Kg aos 42 dias de idade.

Santos et al. (2005), compararam o crescimento, desempenho zootécnico, rendimento de carcaça e qualidade de carne de três linhagens de frango de corte: Cobb, Paraíso Pedrês e ISA Label. Quanto ao desempenho zootécnico, observaram que a linhagem Cobb apresentou maior ganho de peso e consumo de ração em todos os períodos. O alto consumo de ração de linhagens melhoradas é atribuído à maior demanda de nutrientes para atender ao maior potencial de ganho de peso destas linhagens.

A conversão alimentar das aves foi ruim, ocorrendo uma piora no desempenho zootécnico, pois o consumo não foi correspondente no ganho de peso. Para produção de cada quilo de frango, foram necessários 2,43 Kg de ração. Dentre as possíveis causas de impacto na conversão alimentar do lote, os fatores climáticos podem ter prejudicado as aves desde a fase inicial, onde o consumo encontra-se abaixo do recomendado, conforme o Suplemento (2013). A alta umidade relativa aliada à alta temperatura do ar, são fatores climáticos que dificultam o processo de troca de calor das aves com o ambiente (CASSUCE et al, 2013).

Silva et al. (2009), avaliaram o desempenho de aves de linhagem Cobb alimentadas com ração sem suplementação em diversas temperaturas ambientes e constataram que a baixa temperatura provocou o pior resultado de conversão alimentar.

Assim como a conversão alimentar, o parâmetro de eficiência alimentar atesta o baixo desempenho das linhagens. À medida que aumentou a idade das aves, há redução da eficiência das aves no aproveitamento da ração. Esta redução pode ser devido a primeira etapa de utilização do alimento, apresentar digestibilidade alimentar mais baixa (OLIVEIRA et al, 2006; SCHIASSI et al, 2015), tendo como resultado uma relação de conversão alimentar pior. Acredita-se que devido à exposição de frangos ao estresse térmico por calor, essas condições se agravam.

Resultados semelhantes de diminuição na eficiência alimentar de frangos de corte foram observados por Lana et al. (2000), que verificaram que os dados de eficiência só diminuíram nos casos em que temperatura e umidade são elevadas.

Não houve efeito significativo ($P>0,05$) entre as linhagens para o índice de viabilidade. Silva et al. (2017) compararam a viabilidade criatória de linhagens comerciais e notaram maiores índices nos machos, além de apresentaram melhores desempenhos e características de carcaças do que as fêmeas.

O baixo desempenho das aves desde a fase inicial, leva a conclusão de que a dieta basal consumida pelas aves no período inicial de criação, não foi suficiente para maximizar o desempenho zootécnico em condições de baixas temperaturas. No que se refere à formulação da ração o teor de proteína bruta de 20% para a fase inicial.

Quando as aves são expostas a um ambiente com baixa temperatura, uma forma de compensar é consumindo mais proteína do que teoricamente precisam, catabolizando o excesso de alguns aminoácidos que resultaram na produção de calor metabólico. A partir da terceira semana de vida, as aves foram submetidas a um maior estresse calórico, sendo que a dieta nesta fase apresentou 18% de PB. Neste caso, o calor contribuiu para a diminuição do consumo de ração, fazendo com que as aves não conseguissem suprir suas necessidades proteicas.

Vasconcellos et al. (2012), observaram uma piora no desempenho de frangos de corte de linhagem Ross com a redução proteica das rações, ocorrendo um efeito decrescente sobre o ganho de peso, o peso final e o consumo, além de piora na conversão alimentar, à medida que diminuía os níveis de proteína bruta.

Entretanto, Oliveira et al. (2010), ao avaliarem os efeitos de cinco níveis de

proteína bruta em rações (21,6%; 20,6%; 19,6%; 18,6% e 17,6%), para frangos de corte da linhagem Cobb em ambiente de estresse por calor de 22 a 42 dias de idade, constataram que não houve efeito sobre as características de desempenho zootécnico, nem sobre o peso absoluto e o rendimento de cortes nobres, indicando a redução de proteína bruta de 21,6 até 17,6%.

Verificou-se que as linhagens criadas não apresentaram diferenças significativas ($P>0,05$) no rendimento de Carcaça (Car), Cobb (75,09%) e Ross (71,85%) (Tabela 2).

	Rendimento (%)								
	Car	M	C	F	I	GA	Cx	Sc	P
Cobb	72,72	2,27	0,71	2,77	5,66	3,51	14,48	15,94	25,27
Ross	71,85	2,46	0,81	2,77	5,66	3,70	13,92	16,46	24,40
CV(%)	2,72	18,45	15,85	15,41	9,86	13,69	6,48	8,30	8,72

⁽¹⁾Médias seguidas de letras iguais na coluna, não diferem significativamente entre si, pelo teste F ao nível de 5% de probabilidade.

Car: Carcaça; M: Moela; C: Coração; F: Fígado; I: Intestino; GA: Gordura abdominal; Cx: Coxa; Sc: Sobrecoxa e P: Peito.

TABELA 2 - Rendimento de carcaça, vísceras, gordura abdominal e cortes nobres⁽¹⁾.

O rendimento das vísceras comestíveis, Moela (M), Coração (C), Fígado (F), Intestino (I) e gordura abdominal e cortes nobres, Coxa (Cx), Sobrecoxa (Sc) e Peito (P) também não apresentaram diferenças ($P>0,05$), portanto, não foram influenciadas pelos grupos genéticos. Os dados desse estudo, corroboram a Stringhini et al. (2003), que avaliaram quatro linhagens de frango de corte, não verificaram o efeito da linhagem nos parâmetros rendimento de carcaça ou de cortes.

Contudo, esses dados diferem do estudo de Oliveira et al. (2006), que observaram a influência negativa do calor sobre os pesos absolutos de coxa, sobrecoxa e peito, sendo mais agravante, quando esses efeitos são associados ao aumento da umidade relativa do ar.

Marcato et al. (2010), observaram que não houve influência da linhagem nas taxas de crescimento e deposição de nutrientes no coração. As aves de linhagem Ross apresentaram maior atividade metabólica na digestão e síntese de nutrientes com precocidade no crescimento e a linhagem Cobb foi mais precoce no desenvolvimento do intestino e crescimento.

O comportamento, a reprodução e a produção de carne e ovos estão relacionados às condições térmicas ambientais (OLIVEIRA et al., 2006; BROSSI et al.; 2009; CASSUCE et al., 2013).

Sugere-se que as condições ambientais prejudicaram o desempenho produtivo das aves, ocasionando o aumento de dias para chegar ao peso de abate, diminuição da ingestão de ração e piora na conversão alimentar, haja vista, que parte dos nutrientes foi desviada para manutenção da homeotermia.

4 | CONCLUSÃO

O desempenho zootécnico e o rendimento dos frangos de corte de ambas as linhagens mostraram-se inferior ao esperado. Temperaturas inferiores à de conforto durante as primeiras semanas e temperaturas superiores à de conforto nas semanas subsequentes, associadas a grande oscilação da umidade relativa do ar, prejudicaram o desempenho zootécnico e o rendimento produtivo de frangos de corte.

REFERÊNCIAS

API, I.; TAKAHASSHI, S. E.; MENDES, A. S.; PAIXÃO, S. J.; REFATI, R.; RESTELATTO, R. Efeito da sexagem e de linhagens no desempenho e rendimento de carcaça de frangos de corte. **Revista Ciência Animal Brasileira**, v.18, p.1-10, e-32691, 2017. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/cab/v18/1809-6891-cab-18-e32691.pdf>>. doi: 10.1590/1089-6891v18e-32691

BAÊTA, F. C.; SOUZA, C. F. **Ambiência em edificações rurais – conforto animal**. Viçosa: UFV, 2010. 269 p.

BROSSI, C.; CONTRERAS-CASTILLO, C. J.; AMAZONAS E. A.; MENTEN, J. F. M. Estresse térmico durante o pré-abate em frangos de corte. **Ciência Rural**, v.39, n.4, p.1296-1305, 2009. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/cr/v39n4/a145cr387.pdf>>. doi:10.1590/S0103-84782009005000039

CASSUCE, D. C.; TINÔCO, I. F. F.; BAÊTA, F. C.; ZOLNIER, S.; CECON, P. R.; VIEIRA, M. F. A. Thermal comfort temperature update for broiler chickens up to 21 days of age. **Engenharia Agrícola**, v.33, n.1, p.28-36, 2013. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/eagri/v33n1/v33n1a04.pdf>>. doi:10.1590/S0100-69162013000100004

CORDEIRO, M. B.; TINÔCO, I. F. F.; SILVA, J. N.; VIGODERIS, R. B.; PINTO, F. A. C.; CECON, P. R. Conforto térmico e desempenho de pintos de corte submetidos a diferentes sistemas de aquecimento no período de inverno. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v.39, n.1, p.217-224, 2010. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbz/v39n1/29.pdf>>. doi:10.1590/S1516-35982010000100029

DA COSTA, M. J.; ZARAGOZA-SANTACRUZ, S.; FROST, T. J.; HALLEY, J.; PESTI, G. M. Straight-run vs. sex separate rearing for 2 broiler genetic lines Part 1: Live production parameters, carcass yield, and feeding behavior. **Poultry Science**, v.96, n.8, p. 2641-2661, 2017. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28339997>>. doi:10.1093/japr/15.3.362

DALÓLIO, F. S.; MOREIRA, J.; COELHO, J. R.; SOUZA, C. F. Caracterização bioclimática de um galpão experimental de criação de frangos de corte na região de Diamantina-MG. **Engenharia na agricultura**, v.24, n.1, 2016. Disponível em: <<https://periodicos.ufv.br/ojs/reveng/article/view/585/395>>. doi:10.13083/1414-3984/reveng.v24n1p22-31

FERREIRA, D. F. Sisvar: a Guide for its Bootstrap procedures in multiple comparisons. **Ciência e Agrotecnologia**, v.38, n.2, p.109-112, 2014. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/cagro/v38n2/a01v38n2.pdf>>. doi:10.1590/S1413-70542014000200001

GARCIA NETO, M.; CAMPOS, E. C. Suscetibilidade de linhagens de frangos de corte à síndrome ascítica. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v.39, n.8, p.803-808, 2004. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/pab/v39n8/21742.pdf>>. doi:10.1590/S0100-204X2004000800011

LANA, G. R. Q.; ROSTAGNO, H. S.; ALBINO, L. F. T.; LANA, A. M. Q. Efeito da temperatura ambiente e da restrição alimentar sobre o desempenho e a composição da carcaça de frangos de corte. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v.29, n.4, p.1117-1123, 2000. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbz/v29n4/5627.pdf>>. doi:10.1590/S1516-35982000000400024

LI, M.; WU, J.; CHEN, Z. Effects of heat stress on the daily behavior of wenchang chickens. **Brazilian Journal of Poultry Science**, v.17, n.4, p.559-566, 2015. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbca/v17n4/1516-635X-rbca-17-04-00559.pdf>>. doi:10.1590/1516-635X1704559-566

LITZ, F. H.; CARVALHO, C. M. C.; FERNANDES, E. A.; MARTINS, J. M. S.; FAGUNDES, N. S. Efeito de diferentes níveis de energia e proteína na ração sobre o desempenho de frangos de corte da linhagem cobb avian 48TM*. **Veterinária Notícias Veterinary News**, v.20, n.1, p.52-60, 2014. Disponível em: <<http://www.seer.ufu.br/index.php/vetnot/article/view/23466>>. doi:10.14393/VTV20N1a2014.23466

MARCATO, S. M.; SAKOMURA, N. K.; FERNANDES, J. B. K.; SIQUEIRA, J. C.; DOURADO, L. R. B.; FREITAS, E. R. Crescimento e deposição de nutrientes nos órgãos de frangos de corte de duas linhagens comerciais. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v.39, n.5, p.1082-1091, 2010. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbz/v39n5/19.pdf>>. doi:10.1590/S1516-35982010000500019

MARQUES, C.; MAGALHÃES JÚNIOR, A. P.; OLIVEIRA, F. Hidrogeomorfologia da ilha da trindade caracterização da única rede hidrográfica permanente nas ilhas oceânicas brasileiras. Os desafios da geografia física na fronteira do conhecimento. In: I Congresso Nacional de Geografia Física, **Anais...** p.4834-4845, UNICAMP 2017. Disponível em: <<https://ocs.ige.unicamp.br/ojs/sbgfa/article/view/2500>>. doi:10.20396/sbgfa.v1i2017.2598

OLIVEIRA, R. F. M.; DONZELE, J. L.; ABREU, M. L. T.; FERREIRA, R. A.; VAZ, R. G. M. V.; CELLA, P. S. Efeitos da temperatura e da umidade relativa sobre o desempenho e o rendimento de cortes nobres de frangos de corte de 1 a 49 dias de idade. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v.35, n.3, p.797-803, 2006. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbz/v35n3/30072.pdf>>. doi:10.1590/S1516-35982006000300023

OLIVEIRA, W. P.; OLIVEIRA, R. F. M.; DONZELE, J. L.; GOMES, P. C.; MARTINS, M. S.; ASSIS, A. P. Redução do nível de proteína bruta em rações para frangos de corte em ambiente de estresse por calor. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v.39, n.5, p.1092-1098, 2010. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbz/v39n5/20.pdf>>. doi:10.1590/S1516-35982010000500020

PONCIANO, P. F.; YANAGI JUNIOR, L. S. T.; CAMPOS, A. T.; NASCIMENTO, J. W. B. Sistema fuzzy para predição do desempenho produtivo de frangos de corte de 1 a 21 dias de idade. **Engenharia Agrícola**, v.32, n.3, 2012. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/eagri/v32n3/04.pdf>>. doi:10.1590/S0100-69162012000300004

OLIVEIRA, W. P.; OLIVEIRA, R. F. M.; DONZELE, J. L.; GOMES, P. C.; MARTINS, M. S.; ASSIS, A. P. **Tabelas brasileiras para aves e suínos: composição de alimentos e exigências nutricionais**. 3st ed. Viçosa: Editora UFV, DZO, 2011. 252 p.

SANTOS, A. L.; SAKOMURA, N. K.; FREITAS, E. R.; FORTES, C. M. L. S.; CARRILHO, E. N. V. M.; FERNANDES, J. B. K. Estudo do crescimento, desempenho, rendimento de carcaça e qualidade de carne de três linhagens de frango de corte. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v.34, n.5, p.1589-1598, 2005. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbz/v34n5/26640.pdf>>. doi:10.1590/S1516-35982005000500020

SCHIASSI, L.; YANAGI JUNIOR, T.; FERRAZ, P. F.; CAMPOS, A. T.; SILVA, G. E.; ABREU, L. H. Comportamento de frangos de corte submetidos a diferentes ambientes térmicos. **Engenharia Agrícola**, v.35, n.3, p.390-396, 2015. Disponível em: <Comportamento de frangos de corte submetidos a diferentes ambientes térmicos>. doi:10.1590/1809-4430-Eng.Agric.v35n3p390-396/2015

SCHIASSI, L.; YANAGI JÚNIOR, T.; REIS, G. M.; ABREU, L. H.; CAMPOS, A. T.; CASTRO, J. D. O. Modelagem Fuzzy aplicada na avaliação do desempenho de frangos de corte. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental-Agriambi**, v.19, n.2, p.140-146, 2015. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbeaa/v19n2/1415-4366-rbeaa-19-02-0140.pdf>>. doi:10.1590/1807-1929/agriambi.v19n2p140-146

SILVA, M. T. P.; VELOSO, R. C.; PIRES, A. V.; TORRES FILHO, R. A.; PINHEIRO, S. R. F.;

WINKELSTROTTER, L. K.; BARROS, F. J. M.; SENNA, J. A. B. Desempenho e características de carcaça de três genótipos comerciais de frangos de corte alimentados com diferentes dietas. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v.69, n.5, pp.1311-1318, 2017. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/abmvz/v69n5/0102-0935-abmvz-69-05-01311.pdf>>. doi:10.1590/1678-4162-8241

SILVA, V. K.; SILVA, J. D. T.; GRAVENA, R. A.; MARQUES, R. H.; HADA, F. H.; MORAES, V. M. B. Desempenho de frangos de corte de 1 a 21 dias de idade alimentados com rações contendo extrato de leveduras e prebiótico e criados em diferentes temperaturas. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v.38, n.4, p.690-696, 2009. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbz/v38n4/15.pdf>>. doi:10.1590/S1516-35982009000400015

STRINGHINI, J. H.; LABOISSIÈRE, M.; MURAMATSU, K.; LEANDRO, N. S. M.; CAFÉ, M. B. Avaliação do desempenho e rendimento de carcaça de quatro linhagens de frangos de corte criadas em Goiás. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v.32, n.1, p.183-190, 2003. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbz/v32n1/16091.pdf>>. doi:10.1590/S1516-35982003000100023

SUPLEMENTO: desempenho e nutrição para frangos de corte. **Cobb500: Metas de desempenho** [Internet]. 2013. Disponível em: <http://www.cobb-vantress.com/languages/guidefiles/793a16cc-5812-4030-9436-1e5da177064f_pt.pdf> Acesso em: 14 maio 2019

TALEBI, A.; ASRI-REZAEI, S.; ROZEH-CHAI, R.; SAHRAEI, R. Comparative studies on haematological values of broiler strains (Ross, Cobb, Arbor-acres and Arian). **International Journal of Poultry Science**, v.4, n.80, p.573-579, 2005. Disponível em: <<https://scialert.net/abstract/?doi=ijps.2005.573.579>>. doi:10.3923/ijps.2005.573.579

TINÔCO I. F. F. Avicultura industrial: novos conceitos de materiais, concepções e técnicas construtivas disponíveis para galpões avícolas brasileiros. **Revista Brasileira de Ciência Avícola**, v.3, n.1, p.1-26, 2001. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-635X200100010001&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. doi:10.1590/S1516-635X2001000100001

TINÔCO, I. de F. F.; GATES, R. S. **Manejo de matrizes de corte**. Editado por Marcos Macari e Ariel Antônio Mendes - Campinas: FACTA, 421p. p.18-19, 2005.

TONA, K.; ONAGBESAN, O. M.; KAMERS, B.; EVERAERT, N.; BRUGGEMAN, V.; DECUYPERE, E. Comparison of Cobb and Ross strains in embryo physiology and chick juvenile growth. **Poultry science**, v.89, n.8, p.1677-1683, 2010. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20634523>>. doi:10.3382/ps.2009-00386

VASCONCELLOS, C. H. F.; FONTES, D. O.; CORRÊA, G. S. S.; VIDAL, T. Z. B.; SILVA, M. A.; MACHADO, A. L. C.; FERNANDES, I. S.; VIEITES, F. M. Efeitos da redução da proteína dietética sobre o desempenho e as características de carcaça de frangos de corte de 1 a 21 dias de idade. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v.41, n.3, p.662-667, 2012. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rbz/v41n3/28.pdf>>. doi:10.1590/S1516-35982012000300028

SOBRE O ORGANIZADORA

Valeska Regina Reque Ruiz - Possui graduação em Medicina Veterinária pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2004) e mestrado em Aquicultura de Águas Continentais, pelo Centro de Aquicultura da Universidade Estadual Paulista (2005). Atualmente é professor adjunto do Centro de Ensino Superior de Campos Gerais nas Disciplinas de Fisiologia I e II, e Patologia Geral. Tem experiência na área de Medicina Veterinária, com ênfase em aquicultura, fisiologia animal, Histologia Veterinária e Patologia.

ÍNDICE REMISSIVO

A

Abatedouros
Anestesia geral
Animais exóticos
Anomalia
Apicultura
Atordoamento
Avicultura alternativa

B

Bradycardia

C

Castração
Chow Chow
Cistos
Colapso
Conforto térmico
Conservação
Corpo estranho esofágico
Crânio
Cromossomos
Cunicultura

D

Densidade de alojamento
Dermatologia

E

Endoscopia
Ensino
Epidemiologia
Epiderme
Equino
Esofagorrafia

F

Fauna Silvestre
Ferida
Fibroblastos

Fibrose
Frigoríficos

G

Genética
Glicerina Bruta

H

Hiperpigmentação
Hipotensão

I

Infecção uterina
Insensibilização

L

Lesão

M

Mastócitos
Melanina
Mercado
Mineralização óssea
Multimodal

N

Neonato
Neoplasia
Neuroleptoanalgesia
Neutrófilos

O

Oncologia

P

Parto
Pequenos roedores

S

Sal
Semiologia
Suinocultura

T

Temperatura ambiente

U

Umidade Relativa

Urólito

V

Vacas

Agência Brasileira do ISBN
ISBN 978-85-7247-652-2



9 788572 476522