

ECTRÓPIO DA PÁLPEBRA SUPERIOR SECUNDÁRIO AO HERPES ZOSTER OFTÁLMICO

Henrique Souza de Deus

Rodrigo Vuono Brito

Davi Araf

Nathália Tavares Rocha

Ectrópio da pálpebra superior secundário ao herpes zoster oftálmico

Henrique Souza de Deus, Rodrigo Vuono Brito, Davi Araf, Nathália Tavares Rocha

INTRODUÇÃO

O herpes zoster oftálmico afeta principalmente o nervo trigêmio e seu ramo oftálmico. O acometimento do ramo nasociliar associa-se com alterações oculares graves, das quais destacam-se a úlceras de córnea, retração cicatricial da pálpebra e em raros casos, ectrópio palpebral, causando grande morbidade ao paciente. (1)

RELATO DE CASO

Paciente 96 anos, apresentou quadro de herpes zoster há 8 meses com internação hospitalar devido à infecção bacteriana secundária.

Evoluiu com ectrópio de pálpebra superior, ceratite difusa e irritação ocular.

Paciente foi abordada cirurgicamente e realizado retirada de fibroses locais, enxerto retroauricular, enxerto de pálpebra contralateral e cantorrafia obtendo um excelente resultado.




Imagem 1-a: aspecto antes (pré cirurgia), 1-b: aspecto 1º dia pós operatório, 1-c: 60º dia pós operatório

DISCUSSÃO

O ectrópio de pálpebra superior é uma complicação possível após a afecção palpebral pelo vírus da herpes zoster. (2) O enxerto cutâneo para amenizar o encurtamento da lamela anterior pode ser uma boa opção terapêutica para correção funcional da pálpebra. (3)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1-SHELLINI, Silvana Artioli; ZIMMERMANN, Gislaine Priscila Momm; HOYAMA, Erika; PADOVANI, Carlos Roberto; PADOVANI, Carlos Roberto Pereira P. **Alterações da margem palpebral associadas ao ectrópio**. 5. Ed. São Paulo: Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, 2005, 619-622 p.
- 2-KERSTEN, Robert C.; KLEINER, Franklin P.; KULWIN, Dwight R. Tarsotomy for the treatment of cicatricial entropion with trichiasis. **Archives of Ophthalmology**, v. 110, n. 5, p. 714-717, 1992.
- 3- HOKAZONO,Kenzo; OLIVEIRA, Marcelo, MOURA, Castelo Frederico; MONTREIRO, Mário Luiz Ribeiro. **Síndrome do ápice orbitário causada por herpes zóster oftálmico: relato de caso e revisão da literatura**, Rev Bras Oftalmol. 2009; 68 (5): 304-8